



25 ANNI *
OGNI 3 ANNI

30 ANNI & OLTRE
OGNI 5 ANNI

DONNE GIÀ TRATTATE*

UOMINI **
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
ED EVENTUALI
TEST
DIAGNOSTICI

DONNE GIÀ VACCINATE

PAP-TEST

HPV DNA TEST

CONTROLLI

VALUTAZIONE
DI OPPORTUNITÀ
DI VACCINAZIONE
ANCHE NEGLI UOMINI

NEI SOGGETTI VACCINATI
IN PRECEDENZA CON VACCINO
BIVALENTI o QUADRIVALENTI
È POSSIBILE UNA VACCINAZIONE
CON VACCINO NONOVALENTE A CICLO
COMPLETO PREVIO COUNSELING CON
IL MEDICO

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

NEGATIVO

COLPOSCOPIA

PAP-TEST - POSITIVO

CONTROLLO FOLLOW UP

ANNI

CONTROLLO FOLLOW UP

**VACCINAZIONE
ANTI-HPV**

PUOI RECARTI
al CENTRO VACCINALE
DI RIFERIMENTO

LA VACCINAZIONE POST-TRATTAMENTO
È RACCOMANDATA IN QUANTO RIDUCE L'INCIDENZA
DI RECIDIVA E GLI ESITI AL FOLLOW-UP

**ADESIONE AGLI
SCREENING PER
IL CERVICOCARCINOMA**

* VACCINAZIONE GRATUITA SECONDO IL PNPPV 23-25
PER LE DONNE TRATTATE PER LESIONI CIN2+ O DI GRADO
SUPERIORE LA VACCINAZIONE POTRA' ESSERE SOMMINISTRATA
PRIMA DEL TRATTAMENTO O SUCCESSIVAMENTE FINO AD UN
MASSIMO DI 3 ANNI DAL TRATTAMENTO STESSO

** VACCINAZIONE GRATUITA FINO A 18 ANNI SECONDO IL PNPPV 23-25

REFERENZE:

LE 100 DOMANDE SULL'HPV. A CURA DI: IOSSA A, CANUTI D, COGO C. OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING GISC - GRUPPO ITALIANO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA. EDIZIONE 2022; LG GISC - LINEE GUIDA CONDIVISE PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA. RACCOMANDAZIONE: VACCINAZIONE ANTI-HPV
POST TRATTAMENTO. SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ; CANUTI D, DE NUZZO MA. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DELLE DONNE E LE RISPOSTE. IN: COME CAMBIA LO SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA PER LE DONNE VACCINATE CONTRO L'HPV. BOLOGNA, 6 FEBBRAIO 2023.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI



INQUADRA IL QR CODE e accedi al video della mappa:

